


Positionen mit den höchsten relativen Häufigkeiten im Bereich kons./chir. Behandlung 2015 – Deutschland



Anteile der häufigsten Positionen an den Gesamtpunkten aus kons./chir. Behandlung 2015 Deutschland

| Bema- Position | Primär- und Ersatzkassen ¹⁾ | | |
|--|--|---|------|
| | Häufigkeit je 100 Fälle | Anteil an den Gesamtpunkten aus kons./chir. Beh. in % | |
| 01 | Eingehende Untersuchung | 65,85 | 13,5 |
| Ä1 | Beratung | 40,77 | 4,2 |
| 40 | Infiltrationsanästhesie | 37,99 | 3,4 |
| 107 | Zahnsteinentfernung | 36,45 | 6,6 |
| 8 | Vitalitätsprüfung | 25,12 | 1,7 |
| 105 | Lokale medikam. Behandlung | 24,16 | 2,2 |
| 12 | Bes. Maßn. bei Füllungen | 24,04 | 2,7 |
| 13b | Füllung, zweiflächig | 22,94 | 10,2 |
| Ä925a | Röntgen bis 2 Aufnahmen | 20,32 | 2,8 |
| 41a | Leitungsanästhesie, intraoral | 17,57 | 2,4 |
| 106 | Beseitigung Zahnkanten u.ä. | 17,07 | 1,9 |
| 04 | Erhebung des PSI-Code | 16,78 | 1,9 |
| 13a | Füllung, einflächig | 15,44 | 5,6 |
| 38 | Nachbehandlung | 12,69 | 1,4 |
| 25 | Überkappung, indirekt | 12,38 | 0,8 |
| 13c | Füllung, dreiflächig | 10,71 | 6,0 |
| 10 | Behandlung überempf. Zahnflächen | 10,06 | 0,7 |
| 32 | Wurzelkanalaufbereitung | 9,55 | 3,1 |
| IP4 | Lokale Fluoridierung | 7,79 | 1,1 |
| Ä935d | Orthopantomogramm u.ä. | 7,74 | 3,2 |
| 35 | Wurzelkanalfüllung | 7,61 | 1,5 |
| IP5 | Fissurenversiegelung | 7,56 | 1,4 |
| IP1 | Mundhygienestatus | 7,52 | 1,7 |
| IP2 | Mundgesundheitsaufklärung | 7,34 | 1,4 |
| 34 | Medikam. Einlage | 7,08 | 1,2 |
| 49 | Exzision Schleimhaut | 6,91 | 0,8 |
| 13d | Füllung, mehr als 3-flächig | 6,77 | 4,5 |
| 23 | Entfernen Krone u.ä. | 5,28 | 1,0 |
| 28 | Exstirpation der vitalen Pulpa | 4,90 | 1,0 |
| 43 | Extraktion, einwurzelig | 4,01 | 0,5 |
| Ausgewiesene Positionen zusammen | | | 90,4 |
| Restliche Positionen (inkl. FU) | | | 9,6 |
| IP-Positionen (IP1, IP2, IP4, IP5, FU) | | | 5,9 |

¹⁾ Orts-, Betriebs-, Innungs- u. landw. Krankenkassen, Knappschaft, vdek
Grundlage: Einzelleistungsstatistik der KZBV

Positionen mit dem höchsten Anteil am Punktwertvolumen im Bereich kons./chir. Behandlung 2015 – Deutschland

