

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Testort-Musterkasse		72
Name, Vorname des Versicherten		
Mustermann-Müller		
Dr. Johann		geb. am 15.03.66
Musterweg 7		
D 12345 Musterhausen		12/22
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
123456789	A123456789	508060
Abrechnungs-Nr.	Zahnarzt-Nr.	Datum
123456789	123456789	02.07.21

# PARODONTALSTATUS Blatt 1

vom 15.07.2021

## Beispiel 2

<b>Allgemeine und parodontitisspezifische Anamnese</b> <input checked="" type="checkbox"/> Diabetes mellitus <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ <input type="checkbox"/> Tabakkonsum    _____	<b>Spezielle Vorgeschichte</b> Frühere PAR-Therapie Angabe des Jahres: ca. <u>2011</u>
--	--

<b>Diagnose</b> <input checked="" type="checkbox"/> Parodontitis <input type="checkbox"/> Parodontitis als Manifestation systemischer Erkrankungen _____ <input type="checkbox"/> Andere das Parodont betreffende Zustände: generalisierte gingivale Vergrößerungen
--

<b>Stadium</b> (Schweregrad, der Patient wird durch das höchste Stadium charakterisiert)				
	<input type="checkbox"/> Stadium I	<input type="checkbox"/> Stadium II	<input type="checkbox"/> Stadium III	<input checked="" type="checkbox"/> Stadium IV
Röntg. Knochenabbau (KA) (oder interdentaler CAL)	<input type="checkbox"/> < 15 % <input type="checkbox"/> (1 – 2 mm)	<input type="checkbox"/> 15 – 33 % <input type="checkbox"/> (3 – 4 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> > 33 % <input type="checkbox"/> (≥ 5 mm)	
Zahnverlust aufgrund von Parodontitis	<input type="checkbox"/> Nein		<input checked="" type="checkbox"/> ≤ 4 Zähne	<input type="checkbox"/> ≥ 5 Zähne
Komplexitätsfaktoren (anzukreuzen, auch wenn nur ein Faktor aus der jeweiligen Gruppe vorliegt)		<input type="checkbox"/> ST = 5 mm, vorwiegend horizontaler KA	<input type="checkbox"/> ST ≥ 6 mm, vertikaler KA ≥ 3 mm, FB Grad II oder III	<input checked="" type="checkbox"/> Komplexe Rehabilitation wegen mastikatorischer Dysfunktion erforderlich

<b>Ausmaß/Verteilung</b> (für das höchste Stadium) <input checked="" type="checkbox"/> Lokalisiert (< 30 % der Zähne) <input type="checkbox"/> Generalisiert (≥ 30 % der Zähne) <input type="checkbox"/> Molaren-Inzisiven-Muster
--

<b>Grad (Progression)</b> <input type="checkbox"/> Grad A <input type="checkbox"/> Grad B <input checked="" type="checkbox"/> Grad C			
Knochenabbauindex (KA (%)/Alter)	<input type="checkbox"/> < 0,25	<input type="checkbox"/> 0,25 – 1,0	<input checked="" type="checkbox"/> > 1,0
Diabetes	<input type="checkbox"/> Kein Diabetes	<input checked="" type="checkbox"/> HbA 1c < 7,0 %	<input type="checkbox"/> HbA 1c ≥ 7,0 %
Rauchen	<input checked="" type="checkbox"/> Kein Rauchen	<input type="checkbox"/> < 10 Zig./Tag	<input type="checkbox"/> ≥ 10 Zig./Tag

### Anschrift Krankenkasse

### Entscheidung der Krankenkasse

Die Kosten der vorgesehenen systematischen PAR-Behandlung werden übernommen  werden nicht übernommen

Datum, Unterschrift und Stempel der Krankenkasse

**Beispiel 2: Erläuterungen zu den Angaben auf PAR-Status Blatt 1**

**Anamnese/erhobene Befunde**

Alter des Patienten 55 Jahre, Diabetes, kein Tabakkonsum, frühere PAR-Behandlung liegt etwa 10 Jahre zurück

Röntg. Knochenabbau 70 %, Verlust von 3 Zähnen aufgrund von Parodontitis, Sondierungstiefen zwischen 4 mm und 9 mm, starke Auffächerung der Oberkiefer-Frontzähne 13 - 23

**1. Allgemeine und parodontitisspezifische Anamnese**

<b>Allgemeine und parodontitisspezifische Anamnese</b>		<b>Spezielle Vorgeschichte</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Diabetes mellitus	<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	Frühere PAR-Therapie Angabe des Jahres: ca. <u>2011</u>
<input type="checkbox"/> Tabakkonsum	_____	

**2. Diagnose**

<b>Diagnose</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Parodontitis
<input type="checkbox"/> Parodontitis als Manifestation systemischer Erkrankungen _____
<input type="checkbox"/> Andere das Parodont betreffende Zustände: generalisierte gingivale Vergrößerungen

**3. Stadium**

<b>Stadium</b> (Schweregrad, der Patient wird durch das höchste Stadium charakterisiert)				
	<input type="checkbox"/> Stadium I	<input type="checkbox"/> Stadium II	<input type="checkbox"/> Stadium III	<input checked="" type="checkbox"/> Stadium IV
Röntg. Knochenabbau (KA) (oder interdentaler CAL)	<input type="checkbox"/> < 15 % <input type="checkbox"/> (1 – 2 mm)	<input type="checkbox"/> 15 – 33 % <input type="checkbox"/> (3 – 4 mm)		<input checked="" type="checkbox"/> > 33 % <input type="checkbox"/> (≥ 5 mm)
Zahnverlust aufgrund von Parodontitis	<input type="checkbox"/> Nein		<input checked="" type="checkbox"/> ≤ 4 Zähne	<input type="checkbox"/> ≥ 5 Zähne
Komplexitätsfaktoren (anzukreuzen, auch wenn nur ein Faktor aus der jeweiligen Gruppe vorliegt)		<input type="checkbox"/> ST = 5 mm, vorwiegend horizontaler KA	<input type="checkbox"/> ST ≥ 6 mm, vertikaler KA ≥ 3 mm, FB Grad II oder III	<input checked="" type="checkbox"/> Komplexe Rehabilitation wegen mastikatorischer Dysfunktion erforderlich

Es wird nur ein einziger Komplexitätsfaktor benötigt, um die Diagnose hin zum einem höheren Stadium zu verändern. Die starke Auffächerung der Oberkiefer-Frontzähne löst als Komplexitätsfaktor mit der Notwendigkeit der komplexen Rehabilitation das Stadium IV aus.

#### 4. Ausmaß/Verteilung

Ausmaß/Verteilung (für das höchste Stadium)		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalisiert (< 30 % der Zähne)	<input type="checkbox"/> Generalisiert (≥ 30 % der Zähne)	<input type="checkbox"/> Molaren-Inzisiven-Muster

Die Auffächerung der Oberkiefer-Frontzähne 13 - 23 löst als Komplexitätsfaktor das Stadium IV aus. Der Patient hat 29 Zähne, von denen die 6 Oberkiefer-Frontzähne aufgefächert sind. Vom Komplexitätsfaktor der Auffächerung sind demnach 20,7% der Zähne betroffen, womit ein Ausmaß/Verteilung als „Lokalisiert“ anzukreuzen ist.

#### 5. Progression

Grad (Progression)	<input type="checkbox"/> Grad A	<input type="checkbox"/> Grad B	<input checked="" type="checkbox"/> Grad C
Knochenabbauindex (KA (%)/Alter)	<input type="checkbox"/> < 0,25	<input type="checkbox"/> 0,25 – 1,0	<input checked="" type="checkbox"/> > 1,0
Diabetes	<input type="checkbox"/> Kein Diabetes	<input checked="" type="checkbox"/> HbA 1c < 7,0 %	<input type="checkbox"/> HbA 1c ≥ 7,0 %
Rauchen	<input checked="" type="checkbox"/> Kein Rauchen	<input type="checkbox"/> < 10 Zig./Tag	<input type="checkbox"/> ≥ 10 Zig./Tag

Der Knochenabbauindex für den Patienten beträgt 1,3 (Eintrag in Spalte „Grad C“). Es liegt ein Diabetes vor, der HbA 1c liegt nach Auskunft des Hausarztes bei 6,5 (Eintrag in Spalte „Grad B“). Der Patient ist Nichtraucher (Eintrag in Spalte „Grad A“).

Nach Eintrag des Knochenabbauindex (im vorliegenden Fall Grad C), wird die Progression mit Grad C eingestuft. Eine Modifikation der Einstufung auf Basis der Risikofaktoren „Rauchen“ und „Diabetes“ (vergleichbar mit der Heranziehung der Komplexitätsfaktoren beim Stadium) erfolgt in diesem Fall nicht (kein Downgrading durch Risikofaktoren).